



Text: Luis Núñez. Cap del Servei de Sanitat Forestal

## **Cronograma de actuaciones sobre *Cerambyx cerdo* (Banyarriquer).**

Los daños producidos por el insecto (*Cerambyx cerdo*), son sobre las encinas, de manera puntual, pero agresiva y con el paso del tiempo pueden provocar la muerte del árbol.

Lo más conveniente es cortar el árbol afectado, pero en este caso concreto y debido a la escasez de esta especie, se puede valorar la realización de tratamientos costosos (y poco eficaces), o su eliminación.

Con las condiciones de suelo actuales y en las zonas expuestas al sol directo, con poca precipitación, la especie encina (*Quercus ilex*), no podrá sobrevivir.

En las zonas limítrofes la espesura del bosque puede hacer posible su existencia.

Las actuaciones que se pueden realizar son:

<u>ACTUACIÓN</u>	<u>EPOCA</u>
Corte de los árboles afectados, debilitados, enfermos o dañados por el impacto del agua y los que tienen el hongo <i>Hypoxylon mediterraneum</i> . (Objetivo fortalecer la masa).	otoño - invierno
Poda de formación y rejuvenecimiento de las encinas. (Objetivo fortalecer la masa).	otoño - invierno
Reploblación con encinas jóvenes en determinadas zonas. (después de un cerramiento de la parcela).	octubre y noviembre